

PRECAUTIONS STANDARD*

R
A
P
P
E
L

Les précautions standard doivent être appliquées pour tous les patients, dans tous les services dès lors qu'il existe un risque de contact ou de projection avec du sang, des liquides biologiques, des sécrétions ou excrétiens et pour tout contact avec une peau lésée ou une muqueuse.

Lavage et/ou désinfection des mains : après le retrait des gants, entre 2 patients, 2 activités

Port de gants > ils doivent être changés entre 2 patients, 2 activités :

- **SI** risque de contact avec du sang, ou tout autre produit d'origine humaine, les muqueuses ou la peau lésée du patient, notamment à l'occasion de soins à risque, de piqure et lors de la manipulation de tubes de prélèvements biologiques, linge et matériels souillés.

- **ET** lors de tous soins, lorsque les mains du soignant comportent des lésions.

Port de surblouse, lunettes, masque : si les soins ou manipulations exposent à un risque de projection ou d'aérosolisation de sang ou tout autre produit d'origine humaine.

Matériel souillé : vérifier que le matériel a subi un procédé d'entretien (stérilisation ou désinfection) approprié avant d'être réutilisé.

Surface souillée : nettoyer et désinfecter avec un désinfectant approprié les surfaces souillées par des projections ou aérosolisation de sang ou de tout autre produit d'origine humaine.

Transport de prélèvements biologiques, de linge ou de matériel souillé : les prélèvements biologiques, le linge et le matériel souillé par du sang ou tout autre produit d'origine humaine doivent être transportés dans un emballage étanche et fermé.

* D'après CIRCULAIRE DGS/DU N° 98-249 DU 20 avril 1998 relative à la prévention de la transmission d'agents infectieux véhiculés par le sang ou les liquides biologiques lors des soins dans les établissements de santé.

Définitions

ERG : Entérocoque résistant aux glycopeptides
(ou ERV : entérocoque résistant à la Vancomycine)

L'ERG est une bactérie multi-résistante aux antibiotiques dont le réservoir est le tube digestif des patients.

Elle se transmet essentiellement par les mains lors des soins aux patients colonisés ou infectés.

DASRI : Déchet d'Activités de Soins à Risques Infectieux

BMR : Bactérie Multi-Résistante

SHA : Solution Hydro-Alcoolique

DD : Détergent-Désinfectant



Antenne régionale du Cclin Est
CHU – Clinique de Champagne
3 rue de l'Université – 51100 REIMS
tél : 03 26 78 94 91 – fax : 03 26 78 35 60
email : resclin@chu-reims.fr

C-CLIN Est



**INFORMATIONS DESTINEES AUX
PROFESSIONNELS DE SANTE**

**Entérocoque Résistant
aux Glycopeptides (ERG)**

**Précautions « contact »
à appliquer dans les
établissements de santé
pour tout patient porteur
d'ERG**

**Les PRECAUTIONS
PARTICULIERES « CONTACT »
complètent les PRECAUTIONS
« STANDARD »**

D'après Mission-ERG-ARH Lorraine-08.2007

INFORMER LE PATIENT

PATIENT VISITEUR

Education du patient et de ses proches à l'hygiène des mains (SHA)

VISITEUR

Friction SHA à la sortie de la chambre

Surblouse et gants à l'entrée de la chambre, selon protocole de l'établissement

Eviter d'utiliser les toilettes de la chambre

ISOLEMENT GEOGRAPHIQUE DU PATIENT

En chambre seule, cabinet de toilette personnel

Si plusieurs patients ERG+ sont présents **un cohorting** est préconisé (personnel dédié) avec un regroupement possible des patients en chambre double

Pictogramme BMR

à l'entrée de la chambre, dans les dossiers médicaux, de soins, sur le planning mural



Signaler le risque de transmission à tous les intervenants et à toutes les structures susceptibles d'accueillir le patient.

PRECAUTIONS PARTICULIERES

TENUE DU PERSONNEL et HYGIENE DES MAINS

A l'entrée de la chambre : friction SHA, port de surblouse et gants à usage unique

Avant de sortir de la chambre : retirer la surblouse, les gants puis friction SHA

A l'extérieur de la chambre : après avoir fermé la porte, friction SHA

LINGE

Déposer le linge sale dans la chambre dans un sac spécifique (de préférence hydrosoluble) puis réaliser un double emballage à la sortie de la chambre et l'évacuer le jour même.

LOCAUX

Bionettoyage quotidien de la chambre et de l'environnement proche du patient avec le détergent-désinfectant (DD) en vigueur.

PRECAUTIONS PARTICULIERES

TOILETTE

Linge de corps et de toilette (serviette, gants) changés quotidiennement ou plus si nécessaire

N'utiliser que du savon liquide

Si utilisation d'une cuvette, désinfecter la cuvette après chaque utilisation avec le DD en vigueur

Patient incontinent : évacuer immédiatement la protection souillée dans la filière DASRI

Patient continent : sanitaires personnels ou chaise percée, plat à bassin, urinaux nettoyés de préférence dans le lave-bassin, sinon utiliser le DD en vigueur

⇒ si utilisation de détergent, faire suivre* d'une désinfection à l'eau de Javel à 0,5%.

*Dilutions de l'eau de Javel :

- 1 berlingot de 250 ml + 750 ml d'eau = 1 L d'eau de Javel à 2,6%
- 1 L d'eau de Javel à 2,6% + 4 l d'eau = 5 L d'eau de Javel à 0,5%