


Précautions complémentaires d'hygiène face à un cas de diarrhée à Clostridium difficile
31 août 2006

	Précautions "contact"	Spécificités en cas d'infection à <i>Clostridium difficile</i>
Chambre individuelle	Oui (ou à défaut regroupement)	Oui (ou à défaut regroupement)
Désinfection des mains	Utilisation de SHA ou lavage hygiénique	Eviter les SHA. Importance de l' action mécanique du lavage . Après avoir enlevé les gants : Lavage hygiénique (polividone iodée scrub +++) ou Lavage simple suivi de friction SHA
Gants	Dès l'entrée dans la chambre. A éliminer à la sortie de la chambre	Dès l'entrée dans la chambre. A éliminer avant la sortie de la chambre,
Masque, lunettes	En cas de risque de projection de liquide biologique	En cas de risque de projection de liquide biologique
Surblouse à manches longues à usage unique	Contact avec le patient ou son environnement	Contact avec le patient ou son environnement. Mise dès l'entrée dans la chambre et retirée avant de la quitter.
Linge	Selon protocoles établissement	Selon protocoles établissement
Petit matériel et dispositif médicaux	Privilégier l'usage unique ou individualiser les matériels réutilisables	Privilégier l'usage unique ou individualiser les matériels réutilisables
Entretien de l'environnement	Détergent-désinfectant habituel	Après nettoyage au détergent-désinfectant et rinçage, utilisation d'une solution d'eau de javel à 2,6% (un berlingot de 250 ml + 750ml d'eau) ensuite diluée au 1/5 (soit 1litre d'eau de javel à 2,6% + 4 litres d'eau pour un volume final de 5 litres = 0,5% de chlore actif).
Déchets	Sac jaune (DASRI)	Sac jaune (DASRI)
Transport du patient	A limiter	A limiter
Levée des mesures d'isolement	Selon l'infection ou le portage	Dès que le patient est devenu asymptomatique, en pratique 24h à 72 h après la fin de la diarrhée