

En hospitalisation ou en soins à domicile

Signalez votre portage d'ERG aux soignants qui vous procurent des soins afin qu'ils respectent les précautions d'hygiène (hygiènes des mains).

En maison de retraite ou en soins de longue durée

Les précautions d'hygiène sont adaptées par le soignant à l'état de santé des patients et au contexte de l'établissement.

Dans tous les cas l'hygiène corporelle et l'hygiène des mains seront optimisées.

A domicile

Respectez une hygiène corporelle quotidienne

et lavez-vous les mains après être allé aux toilettes.

Si vous devez à nouveau être hospitalisé dans les mois qui suivent, signalez que vous avez été porteur d'un ERG afin qu'une recherche soit faite et des précautions d'hygiène prises dès votre admission.

LE PORTAGE D'ERG

DANS LE TUBE DIGESTIF PEUT ETRE LONG

(PLUSIEURS MOIS)

SANS POUR AUTANT ETRE RESPONSABLE

D'INFECTION.



Antenne régionale du CCLin Est
CHU – Clinique de Champagne
3 rue de l'Université – 51100 REIMS
tél : 03 26 78 94 91 – fax : 03 26 78 35 60
email : resclin@chu-reims.fr



INFORMATIONS DESTINEES AUX PATIENTS ET A LEURS FAMILLES

**Vous êtes porteur
(ou l'un de vos proches)
d'un Entérocoque
Résistant aux
Glycopeptides (ERG)**

**Voici quelques informations
et précautions simples
d'hygiène à respecter pour
éviter de le transmettre**

Qu'est ce que l'ERG (ou ERV) ?

L'ERG (encore appelé ERV) est une bactérie multi-résistante aux antibiotiques (BMR) qui se trouve dans l'intestin de certains patients.

Comment se transmet cette bactérie ?

Essentiellement par les mains



lors des soins aux patients colonisés ou infectés.



Comment sait-on qu'un patient est porteur d'ERG ?

La présence de l'ERG est identifiée par un prélèvement de dépistage au niveau rectal, ou lors d'une infection (urinaire, plaie, etc. ...)

EN HOSPITALISATION DE COURTE ET DE MOYENNE DUREE



Ce logo signifie la présence d'une bactérie multi-résistante.

PRECAUTIONS PARTICULIERES RECOMMANDEES

MESURE ESSENTIELLE POUR LE PATIENT ET LES VISITEURS



AVANT DE SORTIR DE LA CHAMBRE :
HYGIENE DES MAINS AVEC UN
SAVON ANTISEPTIQUE



OU UNE SOLUTION HYDRO-ALCOOLIQUE (SHA)



Isolement géographique du patient

- o **En chambre seule**, cabinet de toilette personnel
- o Si plusieurs patients ERG+ sont présents, **un service de cohorting** peut être organisé (regroupement des patients positifs).
- o Regroupement possible en chambre double de 2 patients positifs.

Toilette du patient

- o **Linge de corps et de toilette** (serviette, gants) changés tous les jours ou plus si nécessaire.
- o **N'utilisez que du savon liquide.**

Visiteurs

- o **A l'entrée de la chambre** : friction SHA et, *éventuellement mais non obligatoire, selon les procédures de l'établissement*, port de surblouse et de gants à usage unique
- o **Avant de sortir de la chambre** : le cas échéant, retirez la surblouse et les gants puis friction SHA
- o **A l'extérieur de la chambre**, après avoir fermé la porte : friction SHA.
- o Evitez d'utiliser les toilettes de la chambre.